



Mofetil micofenolato (CellCept)

Domande comuni che i pazienti pongono sul CellCept

Che cos'è il mofetil micofenolato (CellCept)?

Il mofetil micofenolato è un farmaco immunosoppressore relativamente recente approvato per l'uso in pazienti che sono stati sottoposti ad alcuni trapianti d'organo per prevenire il rigetto. Non è ancora stata provata l'efficacia nella Miastenia Grave (MG). Sono necessari ulteriori studi per determinare la sicurezza e l'efficacia del mofetil micofenolato nella MG.

I ricercatori stanno studiando attentamente questa nuova promettente terapia in alcuni pazienti con MG all'interno di Trial clinici. I Trial clinici sono il modo più sicuro e veloce per valutare se nuovi trattamenti funzionano.

Come agisce il mofetil micofenolato?

Persone affette da MG possono beneficiare della terapia con il mofetil micofenolato quando altri trattamenti immunosoppressivi sono stati inefficaci o sono controindicati. Il mofetil micofenolato sopprime il sistema immunitario e riduce la produzione di anticorpi contro i recettori della placca neuromuscolare.

Quali sono le considerazioni particolari da discutere con il tuo medico prima di utilizzare il mofetil micofenolato?

Prima di prescrivere il mofetil micofenolato, il vostro medico vi chiederà se soffrite di anemia o di altre malattie del sangue, se siete soggetti a emorragie o ematomi, se avete qualche infezione batterica o virale. Se siete una donna, il medico vorrà sapere se siete incinta, se state programmando una gravidanza, o se state allattando.

In studi di laboratorio sugli animali, il mofetil micofenolato ha causato malformazioni alla nascita. Sebbene non siano noti gli effetti sugli esseri umani, le donne in età fertile dovrebbero evitare gravidanze durante l'assunzione del farmaco. Le donne che stanno programmando una gravidanza o che rimangono incinte durante la terapia con il mofetil micofenolato, dovrebbero discutere i potenziali rischi e le opzioni con il loro medico.

Come dovrebbe essere somministrato il mofetil micofenolato?

Il mofetil micofenolato è un farmaco per via orale che dovrebbe essere assunto esattamente come prescritto dal vostro medico per la MG. Inghiottite le pastiglie o le capsule con l'acqua.

Non rompete le pastiglie o aprite le capsule. Se la pelle entra in contatto con il contenuto di una capsula o di una pastiglia rotta, risciacquate abbondantemente con acqua. Siate sicuri di assumere questo farmaco esattamente come prescritto ad intervalli regolari. Se dimenticate una dose di mofetil micofenolato, assumetela il prima possibile. Se ormai è arrivato il momento della dose successiva, allora assumete solo quella. Non assumete mai farmaco in più o dosi doppie.

Il mofetil micofenolato interagisce con altri medicinali?

Il mofetil micofenolato può interagire con altri farmaci. Per questa ragione è importante informare il proprio medico su ogni altro medicinale che state prendendo. Siate sicuri di menzionare anche i farmaci da banco, gli integratori alimentari e prodotti di erboristeria che state utilizzando. Gli antiacidi, i vaccini, la colestiramina (un farmaco per abbassare il colesterolo) e altri farmaci immunosoppressori possono interagire con il mofetil micofenolato.

Quali sono i possibili effetti collaterali del mofetil micofenolato?

Il vostro medico terrà sotto attento controllo le vostre condizioni cliniche per valutare eventuali effetti collaterali. Le persone affette da MG prendono dosi di mofetil micofenolato assai inferiori di quelle utilizzate per il rigetto dei trapianti d'organo. Per questa ragione i più comuni effetti collaterali sono ridotti e principalmente confinati a problemi gastrointestinali, inclusi nausea e diarrea, riduzione dei globuli bianchi, anemia e eritema.

Il mofetil micofenolato riduce leggermente la resistenza alle infezioni. E' importante evitare il contatto con persone con malattie infettive e informare il medico se si notato segni persistenti di infezione.

Come il medico controllerà un paziente che sta assumendo il mofetil micofenolato?

Verranno predisposte visite a scadenza regolare per controllare i progressi del paziente. Durante queste visite il

medico vi porrà una serie di domande, eseguirà un controllo delle condizioni fisiche e chiederà alcuni test di laboratorio che daranno importanti informazioni per valutare la sicurezza e l'efficacia del mofetil micofenolato nella MG. Per controllare la comparsa di eventuale anemia o la riduzione dei globuli bianchi, verranno fatti regolari esami del sangue, più frequentemente nei primi mesi di terapia e quindi meno spesso.

Approved by the MGFA Medical/Scientific and Nurses Advisory Boards
© Myasthenia Gravis Foundation of America, Inc. 2008