



Micofenolato Mofetil (CellCept®)

¿Que es el micofenolato mofetil (CellCept®)?

El Micofenolato Mofetil es una droga inmunosupresora relativamente nueva aprobada para el uso en pacientes que han ciertos trasplantes de organos, para prevenir el rechazo. **Aun no ha sido provada la eficacia de esta droga para la miastenia gravis (MG).** Son necesarios estudios para determinar la seguridad y efectividad del micofenolato mofetil en el tratamiento de la MG. Los investigadores estan activamente estudiando esta nueva y promisoria terapia en ciertos pacientes con MG mediante la realización de estudios clinicos. Dichos estudios son un camino seguro y rapido para encontrar nuevos tratamientos que puedan ser utiles.

¿Como funciona el micofenolato mofetil?

Las personas con MG pueden beneficiarse con la terapia con micofenolato mofetil cuando otros tratamientos inmunosupresores han sido inefectivos o contraindicados. El micofenolato mofetil suprime el sistema inmune y reduce la producción de anticuerpos que atacan los receptores de la union Neuromuscular.

¿Que consideraciones especiales deberia tener su medico antes de comenzar el tratamiento con micofenolato mofetil?

Antes de prescribir micofenolato mofetil, su medico debera preguntarle si usted tiene anemia u otra alteración de la sangre, sangrados inusuales o contusiones, cualquier tipo de infeccion sea viral o bacteriana. Si usted es mujer, su medico debera esperar a saber si usted esta embarazada o planea estarlo o si tiene secrecion mamaria.

Estudios en animales de experimentación se ha reportado malformaciones congenitas en aquellos animales que recibieron micofenolato mofetil. Aunque no son conocidos los efectos en humanos, las mujeres en edad fértil deberian evitar el embarazo mientras esten tomando la droga. Las mujeres que esten planeando un embarazo o aquellas que hayan quedado embarazadas mientras hubieron estado

tomando el micofenolato mofetil deberan discutir con su medico los riesgos potenciales y sus opciones.

¿Como deberia tomarse el micofenolato mofetil?

El micofenolato mofetil es una medicacion oral que debera tomarse exactamente como se lo prescribe su medico. Trague la tableta o capsula con agua. No rompa la tableta ni abra la capsula. Si su piel se puso en contacto con el contenido de la capsula o una tableta rota, lavese adecuadamente con agua. Asegurese que esta tomando esta medicacion exactamente como se la prescribieron a intervalos regulares. Si usted olvido de tomar una dosis de micofenolato mofetil tomela lo mas pronto posible. Si es casi el tiempo de tomar la proxima dosis tome solo esa dosis. Nunca tome una dosis doble.

¿Interactua el micofenolato mofetil con otras medicaciones?

El micofenolato mofetil puede interactuar con otras drogas. Por esta razon es importante que usted le diga a su medico todas las otras medicaciones que esta tomando. Asegurese de mencionar todas las medicaciones sin prescripcion, suplementos nutricionales o cualquier otro producto que usted este usando, aun los naturales. Antiacidos, vacunas, drogas para reducir el colesterol y drogas que suprimen su sistema inmunologico, pueden interactuar con el micofenolato mofetil.

¿Cuales son los posibles efectos adversos del micofenolato mofetil?

Su medico evaluara exhaustivamente su situacion considerando los potenciales efectos adversos. Las personas con MG toman mucho menos dosis de micofenolato mofetil que la que usan los pacientes que han recibido trasplantes para evitar el rechazo. Por esta razon los efectos adversos comunes son limitados y mayormente se vinculan a alteraciones gastrointestinales, incluyendo nauseas y diarrea, disminución de glóbulos blancos de la sangre, anemia y reacciones de la piel (rash cutaneo). El

micofenolato mofetil reduce levemente la resistencia hacia las infecciones. Por lo tanto es importante evitar dicha medicacion en pacientes con enfermedades infecciosas y notificar a su medico si usted desarrolla signos persistentes de infeccion.

¿Como debera el medico monitorear al paciente que toma micofenolato mofetil?

Deberan realizarse visitas regulares a su medico para evaluar la evolucion del paciente. En esas visitas su medico debera preguntarle realizarle una serie de preguntas junto con el examen medico y los tests de laboratorio que proveen información importante para la evaluacion de la seguridad y efectividad del micofenolato mofetil en MG. Para prevenir la anemia o la disminucion de glóbulos blancos, deberan realizarse exámenes de sangre frecuentes durante los primeros meses de esta terapia para luego ir disminuyendo la frecuencia.

Esta publicacion intenta proveer al lector una informacion general para ser usada solamente con fines educativos. Como tal, no podran aplicarse para las necesidades individuales de cada paciente y no deberian ser usadas como base para tomar decisiones acerca del diagnostico, cuidados, o tratamiento de cualquier condicion. En cambio, tales decisiones deberian estar basadas en los consejos del medico o profesional de la salud quien esta directamente familiarizado con elpaciente.La información contenida en esta publicación refleja el punto de vista de los autores, pero no necesariamente la opinión de la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). Cualquier referencia a un producto en particular, forma o uso no constituye acuerdo. MGFA, sus agentes, empleados, Directores, Capítulos, su Comité Medico Cientifico y su Comité de Enfermeria o sus miembros no garantizan la información contenida en esta publicación. Ellos específicamente niegan cualquier garantia de comercializacion, aptitud para cualquier proposito particular o exactitud relativas a la información contenida en esta y no asume responsabilidad por cualquier probable daño resultante del uso de tal información.

The MGFA mission is to facilitate the timely diagnosis and optimal care of individuals affected by myasthenia gravis and closely related disorders and to improve their lives through programs of patient services, public information, medical research, professional education, advocacy and patient care.

Approved by the MGFA Medical/Scientific and Nurses Advisory Boards
 © Myasthenia Gravis Foundation of America, Inc. 2005

Translation into Spanish generously provided by Miastenia Gravis Foundation of Argentina.